



SPECIFIC® F/C-IN-W INTENSIVE SUPPORT WET A NOVÉ SPECIFIC® F/C-IN-L INTENSIVE SUPPORT LIQUID SÚ KOMPLETNÉ VETERINÁRNE DIÉTY PRE INTENZÍVNU STAROSTLIVOSŤ O MAČKY A PSY

Diéty pre psy a mačky po operácii, pri hospitalizácii pre obnovu výživy, v rekonvalescencii a pri mačkách s pečeňovou lipidózou.

- ✓ **Vysoká hladina energie, tukov a bielkovín** na zaistenie dostatku živín aj pri zníženej chuti do jedla
- ✓ **Vysoká stráviteľnosť je dôležitá** pri zníženom príjme potravy
- ✓ Obsahuje **beta-glukány**, vysoký obsah **rybieho tuku**, zinok, selén a arginín na podporu imunity
- ✓ Pridaný **L-karnitín na podporu β-oxidácie** mastných kyselín pri tvorbe energie, napomáhajúcej chudnutiu a efektívnejšiemu riešeniu pečeňovej lipidózy pri mačkách



F/C-IN-W Intensive Support - Wet
mokrú stravu s veľmi vysokou chuťnosťou zaisťujúca zvýšenie príjmu potravy



F/C-IN-L Intensive Support - Liquid
tekutú stravu, špeciálne navrhnutú na kŕmenie injekčnou striekačkou a sondou



DIÉTA SPECIFIC® F/C-IN-L INTENSIVE SUPPORT LIQUID JE IDEÁLNA PRE ASISTOVANÉ KŔMENIE INJEKČNOU STRIEKAČKOU ALEBO SONDOU



Diéty musí mať v čase podania izbovú alebo telesnú teplotu



Sondu prepláchnite pred i po každom kŕmení



KŔMENIE STRIEKAČKOU



1. Konzervou intenzívne trepte po dobu **minimálne 60 sekúnd**
2. Tekutá diéta **môže byť aplikovaná** do papule psa a mačky **priamo striekačkou**

KŔMENIE SONDOU



1. **8 Fr** (vonkajší priemer 2,8 mm) alebo väčší
2.8+ Ø
 2. Konzervou intenzívne trepte **po dobu minimálne 60 sekúnd**
 3. Dobre **pretrepaná diéta môže byť aplikovaná pomocou sondy** určenej na asistované kŕmenie
-
1. **6-8 Fr** vonkajší priemer 2 - 2,8 mm)
2.0 - 2.8 Ø
 2. Pri použití kŕmnych sond s priemerom 2-2,8 mm je potrebné tekutú diétu **rozmixovať po dobu 30 sekúnd**
 3. Rozmixovaná diéta **môže byť aplikovaná pomocou sondy** určenej na asistované kŕmenie

SPECIFIC F/C-IN-L INTENSIVE SUPPORT LIQUID NEPOUŽÍVAJTE DO SOND S PRIEMEROM MENŠIM AKO 6 FR (2 MM)




POUŽITIE SPECIFIC® F/C-IN-W & F/C-IN-L INTENSIVE SUPPORT WET & LIQUID NIE LEN PRE ASISTOVANÉ KŔMENIE



Vzhľadom k vysokej chuti SPECIFIC® Intensive Support sú obe formy tejto diéty (mokrú i tekutú) veľmi vhodné i pre mačky a psy, ktoré sú síce po operácii, hospitalizovaní alebo v rekonvalescencii, ale sú ochotné sami prijímať potravu.

Obe formy tejto diéty môžeme ponúknuť na konzumáciu priamo alebo ich môžeme aplikovať (prelitať/zmiešať) s bežnou potravou.


MAČKY A PSY, KTORÉ SÚ ANOREKTICKÉ MENEJ AKO 3 DNI



Vypočítané množstvo rozdeliť na viac porcií počas dňa



MAČKY A PSY, KTORÉ SÚ ANOREKTICKÉ VIAC AKO 3 DNI



Vypočítané množstvo rozdeliť na viac porcií počas dňa

UCHOVÁVANIE PO OTVORENÍ



F/C-IN-W INTENSIVE SUPPORT WET – MOKRÁ STRAVA



Po otvorení je možné bezpečne uchovávať **3 dni pri max 5 °C**. Konzerva by mala byť zakrytá alebo vložená do plastového vrecúška/nádoby pred vložením do chladničky. F/C-IN-W môže byť tiež rozdelená na malé porcie a zmrazená. Paštétu vždy skrmovať ohriatu na izbovú alebo telesnú teplotu.



F/C-IN-L INTENSIVE SUPPORT LIQUID – TEKUTINA



Po otvorení možno uchovávať **2 dni maximálne pri 5°C**. F/C-IN-L možno tiež rozdeliť na menšie porcie a zamraziť. Po vybratí z chladničky alebo mrazničky dobre premiešajte. Kŕmte vždy s tekutinou ohriatou na izbovú alebo telesnú teplotu.



Viac informácií nájdete na www.specificdiet.sk alebo po načítaní QR kódu.

Cymedica SK, s.r.o. | Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen | +421 45 54 000 40 | info@cymedica.sk | www.cymedica.com



Krýmny návod na postupné zavádzanie SPECIFIC® F/C-IN-W - Intensive Support Wet (mokrú formu - paštétu).

Diéta je určená pre mačky a psy, ktoré neprijímajú potravu alebo sú hospitalizované/ v rekonvalescencii.



Aktuálna telesná hmotnosť (kg)	Krmná dávka v gramoch na deň							
	Bez príjmu potravy menej ako 3 dni			Bez príjmu potravy dlhšie ako 3 dni				
	Deň 1 33.3% RER*	Deň 2 66.7% RER	Deň 3 100% RER	Deň 1 25% RER	Deň 2 50% RER	Deň 3 66.7% RER	Deň 4 75% RER	Deň 5 100% RER
1	18	36	54	13	27	36	40	54
1.5	24	49	73	18	36	49	55	73
2	30	60	90	23	45	60	68	90
2.5	36	71	107	27	53	71	80	107
3	41	82	123	31	61	82	92	123
3.5	46	92	138	34	69	92	103	138
4	51	101	152	38	76	101	114	152
4.5	55	111	166	42	83	111	125	166
5	60	120	180	45	90	120	135	180
5.5	64	129	193	48	97	129	145	193
6	69	137	206	52	103	137	155	206
6.5	73	146	219	55	109	146	164	219
7	77	154	231	58	116	154	173	231
7.5	81	162	244	61	122	162	183	244
8	85	170	256	64	128	170	192	256
9	93	186	279	70	140	186	209	279
10	101	202	302	76	151	202	227	302
11	108	216	325	81	162	216	244	325
12	116	231	347	87	173	231	260	347
13	123	245	368	92	184	245	276	368
14	130	259	389	97	195	259	292	389
15	137	273	410	102	205	273	307	410
16	143	287	430	108	215	287	323	430
17	150	300	450	113	225	300	338	450
18	157	313	470	117	235	313	352	470
19	163	326	489	122	245	326	367	489
20	169	339	508	127	254	339	381	508
25	200	401	601	150	300	401	451	601
30	230	459	689	172	345	459	517	689
35	258	516	773	193	387	516	580	773
40	285	570	855	214	427	570	641	855
45	311	623	934	233	467	623	700	934
50	337	674	1011	253	505	674	758	1011
60	386	773	1159	290	579	773	869	1159
70	434	867	1301	325	650	867	976	1301
80	479	959	1438	359	719	959	1078	1438

* RER (Rest Energy Requirement) = požiadavka na kľudovú energiu

- Paštéta SPECIFIC F/C-IN-W Intensive Support Wet musí mať pri podaní izbovú alebo telesnú teplotu a odporúčané denné množstvo je potrebné rozdeliť na niekoľko menších porcií
- Špeciálna mäkká konzistencia umožňuje ľahký príjem pacientom, ale je možné ju tiež zriediť vodou, a stane sa viac tekutejšou, a tým je umožnené jej podanie striekačkou alebo sondou určenou na asistované kŕmenie
- Pri použití sond je vhodné paštétu zmiešať s 1-2 dielmi vody a premiešať/rozmixovať



Krmy návod pre postupné zavádzanie SPECIFIC® F/C-IN-L - Intensive Support Liquid (tekutina).
 Diéta je určená pre mačky a psy, ktoré neprijímajú potravu alebo sú hospitalizované/
 v rekonvalescencii.



Aktuálna telesná hmotnosť (kg)	Krmná dávka v gramoch na deň							
	Bez príjmu potravy menej ako 3 dni			Bez príjmu potravy dlhšie ako 3 dni				
	Deň 1 33.3% RER*	Deň 2 66.7% RER	Deň 3 100% RER	Deň 1 25% RER	Deň 2 50% RER	Deň 3 66.7% RER	Deň 4 75% RER	Deň 5 100% RER
1	28	57	85	21	43	57	64	85
1.5	38	77	115	29	58	77	86	115
2	48	95	143	36	72	95	107	143
2.5	56	113	169	42	85	113	127	169
3	65	129	194	48	97	129	145	194
3.5	72	145	218	54	109	145	163	218
4	80	160	241	60	120	160	180	241
4.5	88	175	263	66	131	175	197	263
5	95	190	284	71	142	190	213	284
5.5	102	204	305	76	153	204	229	305
6	109	217	326	82	163	217	245	326
6.5	115	231	346	87	173	231	260	346
7	122	244	366	92	183	244	275	366
7.5	128	257	385	96	193	257	289	385
8	135	270	405	101	202	270	303	405
9	147	295	442	110	221	295	331	442
10	159	319	478	120	239	319	359	478
11	171	343	514	128	257	343	385	514
12	183	366	548	137	274	366	411	548
13	194	388	582	146	291	388	437	582
14	205	411	616	154	308	411	462	616
15	216	432	648	162	324	432	486	648
16	227	454	680	170	340	454	510	680
17	237	475	712	178	356	475	534	712
18	248	496	743	186	372	496	557	743
19	258	516	774	194	387	516	581	774
20	268	537	804	201	402	537	603	804
25	317	634	951	238	475	634	713	951
30	363	727	1090	273	545	727	818	1090
35	408	816	1224	306	612	816	918	1224
40	451	902	1353	338	676	902	1015	1353
45	492	986	1478	369	739	986	1108	1478
50	533	1067	1599	400	800	1067	1200	1599
60	611	1223	1834	458	917	1223	1375	1834
70	685	1373	2058	515	1029	1373	1544	2058
80	758	1518	2275	569	1138	1518	1706	2275

* RER (Rest Energy Requirement) = požiadavka na kľudovú energiu

- Tekutá diéta SPECIFIC F/C-IN-L Intensive Support Liquid musí mať pri podaní izbovú alebo telesnú teplotu a odporúčané denné množstvo je potrebné rozdeliť na niekoľko menších porcií
- Špeciálne vyvinuté na podávanie injekčnou striekačkou alebo sondou určenou na asistované kŕmenie

