

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - POTRAVNÍ ALERGIE



| STAV / KONDICE | SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI | HYPO-ALERGENNÍ | NÍZKÝ PROTEIN | MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN | STŘEDNÍ PROTEIN | NÍZKÝ FOSFOR | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR | NÍZKÝ SODÍK | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK | NÍZKÉ KARBHYDRÁTY | VYSOKÉ HLADINY 3 NMK | NÍZKÝ TUK (10-15% DM) | VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM) | VYSOCE STRAVITELNÉ | NÍZKÉ pH MOČI | NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI | NÍZKÁ VLÁKNINA | VYSOKÁ VLÁKNINA | PODPORA GI / FERMENTOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™ | PODPORA RŮSTU | JINÉ | DOPORUČENÁ DIETA | POZNÁMKA |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|-------------------------|--|---|
| POTRAVNÍ ALERGIE | Srdeční selhání BEZ se selhání ledvin | X | | | | | | | X | | (X) | | | | | | | | | | FDW (nemá vysoké 3-NMK) | FDW 0.13 g Na/MJ - nemá vysoké 3 NMK | |
| | GI - maldigesce / malabsorpce | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | FOD-HY, FOW-HY, FDD-HY, FDW | |
| | GI- EPI (exokrinní pankreatická insuficience) | X | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | FOD-HY, FOW-HY, FDD-HY, FDW | |
| | GI-IBD, kolitida, CE (chronická enteropatie) | X | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | Pankreatitida, tolerance tuku do 10-15% DM (sušiny) | X | | | X | | | | | | | X | | X | | | | | | | | FDD-HY, FOD-HY | |
| | Urolitiáza, struvity | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | FDD-HY, FOD-HY, | Nepoužívat FOW-HY (pH > 6.4) |
| | Idiopatická cystitida | X | | | | | | | | | | (X) | | | | | | | | | konzerva | FOW-HY, FDW | |
| | Osteoartritida | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | Obezita | X | | | | | | | | | | (X) | X | X | | | | | | | | FOD-HY, FDD-HY | Kontrola & úprava (snížení) denní dávky |
| | Diabetes mellitus (cukrovka) | X | | | | | | | | | X | (X) | | | | | | | | | | FDW (nemá vysoké 3 NMK), FOD-HY, FDD-HY+ insulin | Léčba cukrovky INZULÍNEM |
| Anorexie, kachexie | X | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY | | |

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná
 ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medicína/adaptace

* Doporučení závisí na problematickém alergenu. Pro případy s identifikovaným problematickým alergenem mohou být vhodné i jiné diety: viz tabulka s přehledem surovin SPECIFIC™ diety.

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - ATOPIE



| STAV / KONDICE | SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI | HYPO-ALERGENNÍ | NÍZKÝ PROTEIN | MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN | STŘEDNÍ PROTEIN | NÍZKÝ FOSFOR | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR | NÍZKÝ SODÍK | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK | NÍZKÉ KARBHYDRÁTY | VYSOKÉ HLADINY 3 NMIK | NÍZKÝ TUK (10-15% DM) | VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM) | VYSOCE STRAVITELNÉ | NÍZKÉ pH MOČI | NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI | NÍZKÁ VLÁKNINA | VYSOKÁ VLÁKNINA | PODPORA GI / FERMENTOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™ | PODPORA RŮSTU | JINÉ | DOPORUČENÁ DIETA | POZNÁMKA |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|----------------------------|---|---|
| ATOPIE | Selhání ledvin | | X | | | X | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Selhání ledvin, růst | | | X | | | X | | | | (X) | | | | X | | | | | X | | FGW, FGD | |
| | Selhání jater, encefalopatie | | X | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Selhání jater, riziko vniku urátů | | X | X | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Srdeční selhání SPOLU se selháním ledvin | | X | | | | X | | X | X | X | | | | | | | | | | | FKD, FKW | |
| | Srdeční selhání BEZ selhání ledvin | | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | FKD, FKW, FGW, FGD nebo FDW (nižší Na0) | |
| | GI - maldigesce / malabsorpce | | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | GI- EPI (exokrinní pankreat. insuficience) | | | | | | | | | | | X | | | X | | | X | | | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | GI-IBD, kolitida, CE (chronická enteropatie) | X | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | Pankreatitida, tolerance tuku do 10-15% DM (sušiny) | | | | | X | | | | | | X | X | | X | | | | | | | FOD-HY | |
| | Urolitiáza, kalcium-oxaláty | | X | | | | | | X | | | X | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Urolitiáza, uráty | | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Urolitiáza, cystiny | | X | | | | | | X | | | X | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Urolitiáza, oxid křemičitý | | | | | | | | X | | | X | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Urolitiáza, struvity | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | FOD-HY, FOD | |
| | Idiopatická cystitida | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | konz. | FOW-HY | |
| | Osteoartritida | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | FJD, FJW, FOD, FOD-HY, FOW-HY, | |
| | Osteoartritida / stáří / chronické selhání ledvin | | X | X | | | X | X | | | | X | | | | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | V závislosti na funkci ledvin a MCS*, pro zvýšení proteinu/ fosforu lze přidat FOD-HY |
| | Obezita | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY, FOD | Kontrola & úprava (snížení) denní dávky |
| | Diabetes mellitus (cukrovka) | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | FED-DM, FEW-DM | |
| Anorexie, kachexie | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY, F/C-IN-W/L | | |

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

*MCS - Muscle Condition Score - Skóre svalové kondice

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - POTRAVNÍ ALERGIE & ATOPIE



| STAV / KONDICE | SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI | HYPO-ALERGENNÍ | NÍZKÝ PROTEIN | MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN | STŘEDNÍ PROTEIN | NÍZKÝ FOSFOR | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR | NÍZKÝ SODÍK | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK | NÍZKÉ KARBOHYDRÁTY | VYSOKÉ HLADINY 3 NMIK | NÍZKÝ TUK (10-15% DM) | VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM) | VYSOCE STRAVITELNÉ | NÍZKÉ pH MOČI | NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI | NÍZKÁ VLÁKNINA | VYSOKÁ VLÁKNINA | PODPORA GI / FERMENTOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™ | PODPORA RŮSTU | JINÉ | DOPORUČENÁ DIETA | POZNÁMKA |
|---------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|----------|------------------|--|
| POTRAVNÍ ALERGIE & ATOPIE | GI - maldigesce / malabsorpce | x | | | | | | | | x | | | | x | | | x | | | | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | GI- EPI (exokrinní pankreatická insuficience) | x | | | | | | | | x | | | | x | | | x | | | | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | GI-IBD, kolitida, CE (chronická enteropatie) | x | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | Pankreatitida, tolerance tuku do 10-15% DM (sušiny) | x | | | x | | | | | x | x | | | x | | | | | | | | FOD-HY | |
| | Urolitiáza, struvity | x | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | FOD-HY | Nepoužívat FOW-HY (pH > 6.4) |
| | Idiopatická cystitida | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | konzerva | FOW-HY | |
| | Osteoartritida | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | Obezita | x | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY | Kontrola & úprava (snížení) denní dávky |
| | Diabetes mellitus (cukrovka) | x | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY | Diabetes mellitus je třeba léčit INZULÍNEM |
| Anorexie, kachexie | x | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY | |

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - SELHÁNÍ LEDVIN



| STAV / KONDICE | SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI | HYPO-ALERGENNÍ | NÍZKÝ PROTEIN | MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN | STŘEDNÍ PROTEIN | NÍZKÝ FOSFOR | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR | NÍZKÝ SODÍK | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK | NÍZKÉ KARBOHYDRÁTY | VYSOKÉ HLADINY 3 NIMK | NÍZKÝ TUK (10-15% DM) | VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM) | VYSOCE STRAVITELNÉ | NÍZKÉ pH MOČI | NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI | NÍZKÁ VLÁKNINA | VYSOKÁ VLÁKNINA | PODPORA GI / FERMENTOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™ | PODPORA RŮSTU | JINÉ | DOPORUČENÁ DIETA | POZNÁMKA |
|------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|---------------------------|----------------------|--|
| SELHÁNÍ LEDVIN | Atopie | | X | | | X | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Selhání ledvin | | | X | | | X | | | | | | | | X | | | | | X | | FGD, FGW | |
| | Selhání ledvin, růst | | X | | | X | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Selhání jater, encefalopatie | | X | | | X | | X | X | | (X) | | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Selhání jater, riziko vniku urátů | | X | | | X | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | FKD, FKW | |
| | Srdeční selhání SPOLU se selháním ledvin | | X | | | X | | X | X | | (X) | | | X | X | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | GI - maldigestce / malabsorpce | | X | | | X | | X | X | | (X) | | | X | X | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | GI- EPI (exokrinní pankreatická insuficience) | | X | | | X | | X | X | | (X) | | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Urolitiáza, kalcium-oxaláty | | X | | | X | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Urolitiáza, uráty | | X | | | X | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Urolitiáza, cystiny | | X | | | X | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Urolitiáza, oxid křemičitý | | X | | | X | | X | X | | X | | | | X | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | Preferována vlhká strava = konzervy + okyselovací prostředek |
| | Urolitiáza, struvity | | X | | | X | | X | X | | (X) | | | | X | | | | | | konzerva | FKW, FKW-P | |
| | Idiopatická cystitida | | X | | | X | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Osteoartritida | | X | | | X | X | X | X | | X | X | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | Kontrola & úprava (snížení) denní dávky |
| | Obezita | | X | | | X | | X | X | X | (X) | | | | X | | | | | | | FGW, FKW, FKW-P, FGD | Vlhká strava = konzervy s velmi nízkým obsahem sacharidů + INZULÍN |
| Diabetes mellitus (cukrovka) | | X | | | X | | X | X | | X | | | X | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P + Mirataz | | |
| Anorexie, kachexie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná ■ vlastnost, kterou dieta nespĺňuje nebo spĺňuje jen částečně, ale je asi nevhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - SELHÁNÍ JATER



*JATERNÍ SELHÁNÍ, ENCEFALOPATIE **JÁTRA, ENCEFALOPATIE NEBO CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN

| STAV / KONDICE | SOUBĚŽNÝ STAV / VLASTNOSTI | HYPO-ALERGENNÍ | NÍZKÝ PROTEIN | MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN | STŘEDNÍ PROTEIN | NÍZKÝ FOSFOR | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR | NÍZKÝ SODÍK | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK | KARBOHYDRÁTY VYSOKÉ HLADINY 3 NMK | NÍZKÝ TUK (10-15% DM) | VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM) | VYSOCE STRAVITELNÉ | NÍZKÉ pH MOČI | NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI | NÍZKÁ VLÁKNINA | VYSOKÁ VLÁKNINA | PODPORA GI / FERMENOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™ | PODPORA RŮSTU | JINÉ | DOPORUČENÁ DIETA | POZNÁMKA |
|--|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|---|---------------|-------|---|---|
| Potravní alergie | | X | X | X | | | | X | X | (X) | | | X | | | | | | | | FDW | |
| Potravní alergie* | | X | X | | | | | X | X | (X) | | | | | | | | | | | FDW | |
| Atopy | | | X | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | FGW, FGD, FKD, FKW, FKW-P | Preference v závislosti na požadované hladině proteinů |
| Selhání ledvin | | | X | | | X | | X | | X | | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P, FGD, FGW | |
| Selhání ledvin, růst | | | | X | | | X | | X | X | | | | | X | | | | X | | FGW, FGD | |
| Srdeční selhání SPOLU se selháním ledvin | | | X | | | X | | X | X | X | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| Srdeční selhání BEZ se selhání ledvin | | | | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | FGW, FGD, FDW | |
| GI - maldigesce/malabsorpce /EPI | | | X | X | | | | X | X | (X) | | | X | | | | | | | | FDW, FKD, FOD-HY, FGD, FGW | Výběr v závislosti na požadované hladině proteinů |
| GI - maldigesce/malabsorpce** | | | X | | | (X) | | X | X | (X) | | | X | | | | | | | | FKD, FKW | |
| GI-IBD, kolitida, CE (chron. enteropatie) | | X | X | X | | | | X | X | X | | | X | | | | | | | | FDW (nemá vysoké 3 NMK) | |
| Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM (suš.) | | | | X | X | | | X | X | | X | | | | | | | | | | FDD-HY, FOD-HY | |
| Pankreatitida vyžad. tuk pod 10% DM (suš.) | | | | X | X | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | |
| Pankreatitida s hyperlipidemií | | | | X | X | | | | X | | | X | | | | | | | | | FRD | Vhodnost závisí na potřebě proteinů |
| Hyperlipidemie | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| Urolitiáza, kalcium-oxaláty | | | X | | | | | X | X | (X) | | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| Urolitiáza, uráty | | | X | | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| Urolitiáza, cystiny | | | X | | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| Urolitiáza, oxid křemičitý | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| Urolitiáza, struvity | | | X | | | X | | X | X | | | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P, FGW, FGD | Doporučena vlhká strava = konzervy & okyselení moči nějakým suplementem |
| Idiopatická cystitida | | | X | X | | | | X | X | (X) | | | | | | | | | | konz. | FKW, FKW-P, FGW | |
| Osteoartritida | | | X | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | FKD, FKW, or FGW (vyšší obsah bílkovin) | |
| Obezita | | | X | X | | | | X | X | (X) | X | | | | | | | | | | FKD, FKW, or FGW (vyšší obsah bílkovin) | Kontrola & úprava (snížení) denní dávky |
| Diabetes mellitus (cukrovka) | | | X | X | | | | X | X | X | (X) | | | | | | | | | | FKD, FKW, or FGW (vyšší obsah bílkovin) | Vlhká strava = konzervy s velmi nízkým obsahem sacharidů + INZULÍN |
| Anorexie, kachexie | | | X | X | | | | X | X | X | | | X | | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P, FGD, FGW + Mirataz | |
| Růst | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | X | | FGW, FGD | |

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medicína/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - SELHÁNÍ SRDCE BEZ SOUBĚŽNÉHO SELHÁNÍM LEDVIN



| STAV / KONDICE | SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI | HYPO-ALERGENNÍ | NÍZKÝ PROTEIN | MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN | STŘEDNÍ PROTEIN | NÍZKÝ FOSFOR | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR | NÍZKÝ SODÍK | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK | NÍZKÉ KARBOHYDRÁTY | VYSOKÉ HLADINY 3 NMMK | NÍZKÝ TUK (10-15% DM) | VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM) | VYSOCE STRAVITELNÉ | NÍZKÉ pH MOČI | NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI | NÍZKÁ VLÁKNINA | VYSOKÁ VLÁKNINA | PODPORA GI / FERMENTOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™ | PODPORA RŮSTU | JINÉ | DOPORUČENÁ DIETA | POZNÁMKA | |
|--|---|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|-------|------------------|---|---|
| SELHÁNÍ SRDCE BEZ SOUBĚŽNÉHO SELHÁNÍM LEDVIN | Potravní alergie | X | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | FDW | (FDW nemá vysokou hladinu 3 NMMK) | |
| | Atopie | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | FGW, FGD | |
| | Selhání jater, encefalopatie | | X | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | FKD, FKW | |
| | Jaterní selhání obecně | | | X | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | FGW, FGD, FDW, FKD, FKW | V závislosti na požadované hladině proteinů |
| | GI - maldigestce/malabsorpce /EPI | | | | | | | X | X | | X | | | X | | | | | | | | | FDW, FGD, FGW, FKD, FKW | |
| | GI-IBD, kolitida, CE (chronická enteropatie) | X | | | | | | X | X | | X | | | X | | | | | | | | | FDW | |
| | Pankreatitida, tolerance tuku do 10-15% DM (sušiny) | | | X | X | | | X | X | | X | X | X | | | | | | | | | | FCD-L | |
| | Urolitiáza, kalcium-oxaláty | | X | X | | | | X | X | | X | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| | Urolitiáza, uráty | | X | | | | | X | X | | X | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| | Urolitiáza, cystiny | | X | | | | | X | X | | X | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| | Urolitiáza, oxid křemičitý | | | | | | | X | X | | X | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| | Urolitiáza, struvity | | | | | | X | X | X | | X | | | | | X | | | | | | | FKD, FKW, FGW, FGD | Doporučena vlhká strava = konzervy & okyselení moči nějakým suplementem |
| | Idiopatická cystitida | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | konz. | | FGW, FKW | |
| | Osteoartritida | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | FKD, FKW, or FGW (vyšší obsah bílkovin) | Pokud je požadován vyšší obsah bílkovin: smíchejte s FJD/FJW |
| | Obezita | | | | | | | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | FKD, FKW, or FGW (vyšší obsah bílkovin) | Kontrola & úprava (snížení) denní dávky |
| | Diabetes mellitus (cukrovka) | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | FKW/FGW (vyšší obsah bílkovin) | Léčba INZULÍNEM |
| | Anorexie, kachexie | | | | | | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | | FKD, FKW, + Mirataz | ...Nebo jen chutná strava: AVCIM: upřednostněte energetický příjem před omezením Na |
| Růst | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | X | FGW, FGD | | |

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nevhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - SELHÁNÍ SRDCE SPOLU SE SOUBĚŽNÝM SELHÁNÍM LEDVIN



| STAV / KONDICE | SOUBĚŽNÝ STAV / VLASTNOSTI | HYPO-ALERGENNÍ | NÍZKÝ PROTEIN | MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN | STŘEDNÍ PROTEIN | NÍZKÝ FOSFOR | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR | NÍZKÝ SODÍK | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK | NÍZKÉ KARBHYDRÁTY | VYSOKÉ HLADINY 3 NMIK | NÍZKÝ TUK (10-15% DM) | VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM) | VYSOCE STRAVITELNÉ | NÍZKÉ pH MOČI | NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI | NÍZKÁ VLÁKNINA | VYSOKÁ VLÁKNINA | PODPORA GI / FERMENTOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™ | PODPORA RŮSTU | JINÉ | DOPORUČENÁ DIETA | POZNÁMKA |
|--|---|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|----------|--------------------|--|
| SELHÁNÍ SRDCE SPOLU SE SOUBĚŽNÝM SELHÁNÍM LEDVIN | Atopie | | X | | | X | | X | X | | X | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| | Selhání ledvin, růst | | | X | | | X | | | | X | | | | | X | | | | X | | FGD, FGW | Na konci růstu: změnit na FKD, FKW, FKW-HY (u velmi mladých koťat může být přidáno FOW-HY) |
| | Selhání jater, encefalopatie | | X | | | X | | X | X | | X | | | | | | | | | | | FKD, FKW | |
| | Selhání jater, riziko vniku urátů | | X | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| | GI - maldigestce/malabsorpce | | X | | | X | | X | X | | X | | | X | | | X | | | | | FKD, FKW | |
| | GI- EPI (exokrinní pankreatická insuficience) | | X | | | X | | X | X | | X | | | X | | | X | | | | | FKD, FKW | |
| | Urolitiáza, kalcium-oxaláty | | X | | | X | | X | X | | X | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| | Urolitiáza, uráty | | X | | | X | | X | X | | X | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| | Urolitiáza, cystiny | | X | | | X | | X | X | | X | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| | Urolitiáza, oxid křemičitý | | X | | | X | | X | X | | X | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| | Urolitiáza, struvity | | X | | | X | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | FKD, FKW | Doporučena vlhká strava = konzervy & pokud je potřeba okyselujte moč |
| | Idiopatická cystitida | | X | | | X | | X | X | | X | | | | | | | | | | konz. | FKW | |
| | Osteoartrtida | | X | | | X | | X | X | | X | | | | | | | | | | | FKD, FKW | |
| | Obezita | | X | | | X | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | FKD, FKW | Kontrola & úprava (snížení) denní dávky |
| | Diabetes mellitus (cukrovka) | | X | | | X | | X | X | X | X | (X) | | | | | | | | | | FKD, FKW+ INSULIN | Léčba INZULÍNEM (preferována vlhká strava = konzervy) |
| | Anorexie, kachexie | | X | | | X | | X | X | | X | | | X | | | | | | | | FKD, FKW + Mirataz | |
| Růst | | | X | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | X | | FGW, FGD | | |

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nevhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - KLOUBY



| STAV / KONDICE | SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI | HYPO-ALERGENNÍ | NÍZKÝ PROTEIN | MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN | STŘEDNÍ PROTEIN | NÍZKÝ FOSFOR | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR | NÍZKÝ SODÍK | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK | NÍZKÉ KARBOHYDRÁTY | VYSOKÉ HLADINY 3 NIMK | NÍZKÝ TUK (10-15% DM) | VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM) | VYSOCE STRAVITELNÉ | NÍZKÉ pH MOČI | NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI | NÍZKÁ VLÁKNINA | VYSOKÁ VLÁKNINA | PODPORA GI / FERMENTOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™ | PODPORA RŮSTU | JINÉ | DOPORUČENÁ DIETA | POZNÁMKA | |
|-----------------------|---|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|------|------------------|--|--|
| KLOUBY | Potravní alergie | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY | | |
| | Selhání ledvin | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Selhání jater | | X | X | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P, FGW | |
| | Selhání srdce | | | | | | | X | X | | X | | | | | | | | | | | | FGW, FKD, FKW | |
| | GI - maldigesce/malabsorpce/EPI | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | GI-IBD, kolitida, CE (chronická enteropatie) | X | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | Pankreatitida, tolerance tuku do 10-15% DM (sušiny) | | | X | X | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | FOD-HY | |
| | Obezita / WR | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | FJD/W (<15% nadváha), FRD (> 15% nadváha pro počáteční hubnutí) | |
| | Cukrovka | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | FED-DM, FEW-DM | |
| | Urolitiáza, struvity | | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | FJD, FJW | |
| | Urolitiáza, kalcium-oxaláty | | X | | | | | | X | X | X | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| | Urolitiáza, uráty | | X | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| | Urolitiáza, cystiny | | X | | | | | | X | X | X | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW | |
| Idiopatická cystitida | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | wet | | FJW | | |

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nevhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - CUKROVKA



| STAV / KONDICE | SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI | HYPO-ALERGENNÍ | NÍZKÝ PROTEIN | MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN | STŘEDNÍ PROTEIN | NÍZKÝ FOSFOR | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR | NÍZKÝ SODÍK | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK | NÍZKÉ KARBONÁTY | VYSOKÉ HLADINY 3 NMK | NÍZKÝ TUK (10-15% DM) | VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM) | VYSOCE STRAVITELNÉ | NÍZKÉ pH MOČI | NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI | NÍZKÁ VLÁKNINA | VYSOKÁ VLÁKNINA | PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™ | PODPORA RŮSTU | JINÉ | DOPORUČENÁ DIETA | POZNÁMKA |
|------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|---|---------------|------------|--|--|
| CUKROVKA | Potravní alergie | X | | | | | | | | X (X) | | | | | | | | | | | | FDW, FOD-HY, FDD-HY, FOW-HY + INSULIN | Léčba cukrovky INZULÍNEM |
| | Atopie | | | | | | | | | X X | | | | | | | | | | | | FED-DM, FEW-DM | |
| | Potravní alergie a atopie | X | | | | | | | | X X | | | | | | | | | | | | FOD-HY, FOW-HY + INSULIN | Léčba cukrovky INZULÍNEM |
| | Ledviny | | X | | | X | | X | | X (X) | | | | | X | | | | | | | FGW, FKW, FKW-P, FKD, (+ INSULIN) | Vlhká strava = konzervy s velmi nízkým obsahem sacharidů + INZULÍN |
| | Játra obecně | | X | X | | | | X | X | X (X) | | | | | | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P, or FGW (higher protein) + INSULIN | Léčit INZULÍNEM (vlhká strava = konzervy FKW, FKW-P, FGW s nižším obsahem sacharidů) |
| | Játra encefalopatie | | X | | | | | X | | X (x) | | | | | | | | | | | | FKD, FKW, FKW-P, (+ INSULIN) | |
| | Játra cholestáza | | | X | X | | | | | X | | | X | X | | | | X | | | | FRD, FRW | Nemá střední hladinu proteinů !! |
| | Srdce bez selhání ledvin | | | | | | | X | X | X X | | | | | | | | | | | | FGW, FKW, FKD (+insulin) | Vlhká strava = konzervy strava s velmi nízkým obsahem sacharidů + INZULÍN |
| | Srdce + selhání ledvin | | X | | | X | | X | | X (x) | | | | | | | | | | | | | |
| | GI - maldigestce/malabsorpce/EPI | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | F/C-IN-W/L, F-BIO-W, FXW, FPW | |
| | GI-IBD, kolitida, CE (chron. enteropat.) | X | | | | | | | | X X | | | | | X | | | | | | | FOD-HY + INSULIN | |
| | GI-IBD, kolitida, CE s nízkým obsahem tuku | X | | | | | | | | X X | X | X | X | X | X | | | | | | | FOD-HY + INSULIN | |
| | GI - PLE | X | | | | | | | | X X | X | X | X | X | X | | | | | | | FOD-HY + INSULIN | |
| | GI - Lymphangiectasia | X | | | | | | | | X X | X | X | X | X | X | | | | | | | FOD-HY + INSULIN | |
| | Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM | | | | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | FED-DM | |
| | Pankreatitida vyžadující tuk pod 10% DM | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | FRD, FRW | |
| | Pankreatitida s hyperlipidemií | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | FRD, FRW | NE s nízkým obsahem sacharidů, ale s vysokým obsahem vlákniny |
| | Hyperlipidemie | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | FRD, FRW | |
| | Urolitiáza, kalcium-oxaláty | | X | | | | | X | X | X X | | | | | | X | | | | | | FKW, FKW-P + INSULIN | |
| | Urolitiáza, uráty | | X | | | | | | | X X | | | | | | X | | | | | | FKW, FKW-P + INSULIN | |
| | Urolitiáza, cystiny | | X | | | | | X | X | X X | | | | | | X | | | | | | FKW, FKW-P + INSULIN | |
| | Urolitiáza, oxid křemičitý | | | | | | | X | X | X X | | | | | | X | | | | | | FKW, FKW-P + INSULIN | |
| | Urolitiáza, struvity | | | | | | | | | X X | | | | | X | | | X | | | | FCW-P, FEW-DM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | FRD | |
| | Idiopatická cystitida | | | | | | | | | X X | | | | | | | | | | | | konz. FEW-DM, FXW, FXW-P, F-BIO-W | |
| | Osteoartritida | | | | | | | | | X X | | | | | | | | | | | | FED-DM, FEW-DM | |
| | Obezita | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | | | FRD, FRW | |
| Anorexie, recovery, kachexie | | | | | | | | | X X | | | | | X | | | | | | | F/C-IN-W/L | | |

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná vlastnost, kterou dieta nespĺňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - RŮST



| STAV / KONDICE | SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI | HYPO-ALERGENNÍ | NÍZKÝ PROTEIN | MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN | STŘEDNÍ PROTEIN | NÍZKÝ FOSFOR | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR | NÍZKÝ SODÍK | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK | NÍZKÉ KARBOHYDRÁTY | VYSOKÉ HLADINY 3 NNMK | NÍZKÝ TUK (10-15% DM) | VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM) | VYSOCE STRAVITELNÉ | NÍZKÉ pH MOČI | NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI | NÍZKÁ VLÁKNINA | VYSOKÁ VLÁKNINA | PODPORA GI / FERMENTOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™ | PODPORA RŮSTU | JINÉ | DOPORUČENÁ DIETA | POZNÁMKA | |
|----------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|------|------------------------|----------------------------------|---|
| RŮST | Potravní alergie | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | FDD-HY, FOD-HY, FOW-HY | | |
| | Atopie | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | X | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | Kombinovaná alergie (atopie & potravní alergie) | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | Selhání ledvin | | | X | X | | X | | | | (X) | | | | | X | | | | | X | | FGD, FGW | V závislosti na věku a funkci ledvin může být požadováno přidat FPW/FXW nebo F/C-IN-W/L, aby byly splněny požadavky na živiny |
| | Selhání jater, shunt/encefalopatie | | | X | X | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | FGD, FGW | |
| | Selhání jater, riziko vzniku urátů | | | X | X | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | FGW, FGD | |
| | Srdeční selhání SPOLU se selháním ledvin | | | X | X | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | X | | FGW, FGD | |
| | Srdeční selhání BEZ se selháním ledvin | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | X | | FGW, FGD | |
| | GI - maldigesce/malabsorpce | | | | | | | | | | | | | | X | | X | (X) | X | X | X | | FID, FIW, FOD-HY, FOW-HY, FDD-HY | |
| | GI - EPI | | | | | | | | | | | | | | X | | X | (X) | X | X | X | | FID, FIW, FOD-HY, FOW-HY, FDD-HY | + trávicí enzymy |
| | GI-IBD, kolitida, CE (chron. enteropat.) | X | | | | | | | | | X | | | | X | | | | (X) | X | X | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | GI-IBD, kolitida, CE s nízkým obsahem tuku | X | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | (X) | X | X | | FOD-HY, FOW-HY | Může být vyžadována redukce tuku |
| | GI - PLE | X | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | (X) | X | X | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | GI - Lymphangiectasia | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | (X) | X | X | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM | | | | | X | | | | | (X) | X | | | X | | | | | | X | | FDD-HY, FOD-HY, FND | |
| | Pankreatitida vyžadující tuk pod 10% DM | | | | | X | | | | | (X) | | X | (X) | | | | | | | X | | FRD | |
| | Pankreatitida s hyperlipidemií | | | | | X | | | | | (X) | X | X | X | X | | | | | | X | | FRD, FND, FOD-HY, FDD-HY | FOD-HY má vysokou hladinu 3 NNMK |
| | Hyperlipidemie | | | | | | | | | | (X) | | X | | | | | | | | X | | FRD | |
| | | | | | | | | | | | (X) | X | | | | | | | | | X | | FND, FOD-HY, FDD-HY, FRW | FOD-HY má vysokou hladinu 3 NNMK |
| | Urolitiáza, kalcium-oxaláty | | | X | | | | | X | | | | | | | X | | | | | X | | FGW, FGD -check pH | V případě potřeby přidejte citrát draselný, po dosažení dospělosti přejděte na FKW/FKD |
| Urolitiáza, uráty | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | FGW, FGD -check pH | | |
| Urolitiáza, cystiny | | | X | | | | | X | | | | | | | X | | | | | X | | FGW, FGD -check pH | | |
| Urolitiáza, oxid křemičitý | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | X | | FGW, FGD -check pH | | |

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná vlastnost, kterou dieta nespĺňuje nebo spĺňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - RŮST (POKRAČOVÁNÍ)



| STAV / KONDICE | SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI | HYPO-ALERGENNÍ | NÍZKÝ PROTEIN | MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN | STŘEDNÍ PROTEIN | NÍZKÝ FOSFOR | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR | NÍZKÝ SODÍK | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK | NÍZKÉ KARBOHYDRÁTY | VYSOKÉ HLADINY 3 NMIK | NÍZKÝ TUK (10-15% DM) | VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM) | VYSOCE STRAVITELNÉ | NÍZKÉ pH MOČI | NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI | NÍZKÁ VLÁKNINA | VYSOKÁ VLÁKNINA | PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™ | PODPORA RŮSTU | JINÉ | DOPORUČENÁ DIETA | POZNÁMKA | |
|----------------|---|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|---|---------------|-------|------------------------|---|-----------------------|
| RŮST | Struvitová urolitiáza, mladá koťata < 6 měsíců | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | X | | FND (zkontrolujte UTI) | V případě infekce močových cest (UTI): antibiotika a dieta pouze krátkodobá | |
| | Struvitová urolitiáza, koťata nad 6 měsíců, více jak k 50% struvitů | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | FCD, FCW, FCW-P | |
| | Idiopatická cystitida | | | | | | | | | | (X) | | | | | | | | | X | konz. | | FPW, FOW-HY, FIW | |
| | Osteoartritida | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | FOD-HY, FOW-HY | |
| | Obezita | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | X | | FRD, FRW | |
| | Diabetes mellitus (cukrovka) | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | X | | F-BIO-W; FED/W-DM + CaP; nebo FRD/FRW | Doporučeno přidat CaP |
| | Anorexie, kachexie | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | X | | FPW, F/C-IN-W/L, FOD-HY, FOW-HY | |

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - SMÍŠENÉ UROLITY



| STAV / KONDICE | SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI | HYPO-ALERGENNÍ | NÍZKÝ PROTEIN | MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN | STŘEDNÍ PROTEIN | NÍZKÝ FOSFOR | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR | NÍZKÝ SODÍK | STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK | NÍZKÉ KARBONHYDRÁTY | VYSOKÉ HLADINY 3 NIMK | NÍZKÝ TUK (10-15% DM) | VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM) | VYSOCE STRAVITELNÉ | NÍZKÉ pH MOČI | NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI | NÍZKÁ VLÁKNINA | VYSOKÁ VLÁKNINA | PODPORA GI / FERMENTOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™ | PODPORA RŮSTU | JINÉ | DOPORUČENÁ DIETA | POZNÁMKA |
|-----------------|--|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|------|------------------|---|
| SMÍŠENÉ UROLITY | Struvity, kalcium-oxaláty | | X | | | | | X | X | | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | Sledujte opakování UTI SG < 1,030 : použijte vlhké krmivo = konzervy nebo suché krmivo (granule) přelijte před podáním teplou vodou Zkontrolujte pH – pokud je příliš nízké: přidejte citrát draselný (počáteční dávka 2x denně 50-75 mg/kg) |
| | Struvity, uráty | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Struvity / kalcium-fosfáty | | | | | X | | X | X | | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Struvity / kalcium-oxaláty / kalcium-fosfáty | | X | | | X | | X | X | | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Kalcium-oxaláty / kalcium-fosfáty | | X | | | X | | X | X | | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Struvity / uráty / kalcium-fosfáty | | X | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |
| | Struvity / oxid křemičitý | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | FKD, FKW, FKW-P | |

SNÍŽENÍ FREKVENCE RECIDIVY - Smíšené kameny nelze rozpustit; často počáteční kámen způsobí infekci močových cest (UTI), která způsobí precipitaci struvitů. Snížení recidivy je zaměřeno na počáteční kámen.

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná
 ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace



Cymedica CZ, a.s.,

Pod Nádražím 308, CZ 268 01 Hořovice

tel.: +420 311 706 211

e-mail: info@cymedica.cz | www.cymedica.com

Cymedica SK, s.r.o.

Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen

tel. 045 54 000 40

e-mail: info@cymedica.sk | www.cymedica.com

www.specifiddiet.cz

