

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - POTRAVNÍ ALERGIE



STAV / KONDICE	SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3 NMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
POTRAVNÍ ALERGIE	Selhání ledvin, růst (> 14 týdnů)	X		X			X									X				X		CDD	Pro dospělé s přípravkem vychytávajícím fosfor, popř. Porus One
	Selhání jater, riziko vniku urátů	X		X												X						CDD	Nízký obsah purinů (LP)
	Selhání jater, cholestáza	X		X									X									CID-LF, CIW-LF	
	GI - maldigesce / malabsorpce	X												X			X		(X)			COD-HY, COW-HY, CDD-HY, CDW, CID-LF, CIW-LF	
	GI - EPI (exokrinní pankreatická insuficience)	X												X			X		(X)			COD-HY, COW-HY, CDD-HY, CDW, CID-LF, CIW-LF	
	GI - IBD, kolitida, CE (chronická enteropatie)	X									X			X					(X)			COD-HY, COW-HY, CID-LF, CIW-LF	
	GI - IBD, kolitida, CE low fat (chronická enteropatie s nízkými tuky)	X											X	X					(X)			CID-LF, CIW-LF	
	GI - PLE (eneteropatie se ztrátou proteinů)	X											X	X					(X)			CID-LF, CIW-LF	
	GI - Lymfangiektázie	X											X	X					(X)			CID-LF, CIW-LF	
	Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM (suš.)	X			X							X		X					(X)			CDD, CDD-HY, COW-HY	
	Pankreatitida vyžad. tuk pod 10% DM (suš.)	X			X								X	X					(X)			CID-LF, CIW-LF	
	Pankreatitida s hyperlipidemií	X			X								X	X					(X)			CID-LF, CIW-LF	
	Hyperlipidemie	X			X								X									CID-LF, CIW-LF	
	Urolitiáza, kalcium-oxaláty	X	X					X			(X)					X						CDD	
	Urolitiáza, uráty	X	X													X					Low purine	CDD	
	Urolitiáza, cystiny	X	X					X	X							X						CDD	
	Urolitiáza, oxid křemičitý	X						X	X							X						CDD	
	Urolitiáza, struvity	X													X							COW-HY, COD-HY, CDD-HY + Poznámka	Léčit antibiotiky a dočasně okyselovač moči
	Osteoartritida	X									X											COD-HY, COW-HY	
	Osteoartritida, nadváha	X									X	X										CID-LF, CIW-LF	Tyto diety mají vyšší až vysokou hladinu energie a živin - pro obézní zvířata se
		X									X	X										COD-HY, COW-HY	
	Obezita	X									(X)		X									CID-LF, CIW-LF	
	Diabetes mellitus (cukrovka)	X								X	(X)											COD-HY/COW-HY + Inzulín	
	Anorexie, kachexie	X									X			X								COD-HY, COW-HY	

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná
■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

* Doporučení závisí na alergenu, který problémy způsobuje. Pro případy s identifikovaným problematickým alergenem mohou být vhodné i jiné diety: viz tabulka s přehledem surovin SPECIFIC™ diety na www.specifickdiety.cz - sekce Tabulky.

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - ATOPIE



STAV / KONDICE	SOUBĚŽNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBONHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3 NMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
ATOPIE	Selhání ledvin		X			X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	Selhání ledvin, růst			X			X				(X)					X				X		CGW	
	Selhání jater, encefalopatie		X					X	X		X											CKD, CKW	
	Selhání jater, riziko vniku urátů			X							X					X						CKD, CKW	
	Selhání jater, cholestáza			X							X		X									CID-LF, CIW-LF	
	Srdeční selhání SPOLU se selháním ledvin		X			X		X	X		X											CKD, CKW	
	Srdeční selhání BEZ selhání ledvin							X	X		X											COD	
	GI - maldigesce / malabsorpce										X			X			X		(X)			COD-HY, COW-HY	
	GI - EPI (exokrinní pankreatická insuficience)										X			X			X		(X)			COD-HY, COW-HY	
	GI - IBD, kolitida, CE (chronická enteropatie)	X									X			X					(X)			COD-HY, COW-HY, CID-LF, CIW-LF	
	GI - IBD, kolitida, CE low fat (chronická enteropatie s nízkými tuky)	X									X		X	X					(X)			CID-LF, CIW-LF	
	GI - PLE (eneteropatie se ztrátou proteinů)	X									X		X	X					(X)			CID-LF, CIW-LF	
	GI - Lymfangiektázie										X		X	X					(X)			CID-LF, CIW-LF	
	Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM (suš.)				X						X	X		X								COW-HY	
	Pankreatitida vyžad. tuk pod 10% DM (suš.)				X						X		X	X								CID-LF, CIW-LF	
	Pankreatitida s hyperlipidemií				X						X	X	X	X								CID-LF, CIW-LF	
					X						X	X		X								COW-HY	
	Hyperlipidemie										X		X									CID-LF, CIW-LF	
	Urolitiáza, kalcium-oxaláty		X					X			X					X						CKD, CKW	
	Urolitiáza, uráty		X								X					X						CKD, CKW	
	Urolitiáza, cystiny		X					X			X					X						CKD, CKW	
	Urolitiáza, oxid křemičitý							X			X					X						CKD, CKW	
	Urolitiáza, struvity										X				X							COD, COD-HY, COW-HY + Poznámka	Léčit antibiotiky a dočasně okyselovač moči
	Osteoartritida										X											COD, CJD, COD-HY, COW-HY	
	Osteoartritida, nadváha										X											CJD	Tato dieta má moderovanou hladinu energie a živin - pro obézní zvířata je vhodné monitorovat a upravovat denní příjem v gramech
	Osteoartritida, senior/CRF (chronické selhání ledvin)		X	X		X	X				X											CKD, CKW, CGW	
	Obezita										X		X									CID-LF, CIW-LF	
	Diabetes mellitus (cukrovka)									X	X											CED-DM, F/C-IN-W	
	Anorexie, kachexie										X			X								COD, COD-HY, COW-HY	

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná
 ■ vlastnost, kterou dieta nespĺňuje nebo spĺňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO KOČKY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - POTRAVNÍ ALERGIE & ATOPIE



STAV / KONDICE	SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3 NMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
POTRAVNÍ ALERGIE & ATOPIE	Selhání jater, riziko vniku urátů	X		X							X					X						CDD	
	Selhání jater, cholestáza	X		X							X		X									CID-LF, CIW-LF	
	GI - maldigesce / malabsorpce	X									X			X			X	(X)				COD-HY, COW-HY, CID-LF, CIW-LF	
	GI - EPI (exokrinní pankreatická insuficience)	X									X			X			X	(X)				COD-HY, COW-HY, CID-LF, CIW-LF	
	GI - IBD, kolitida, CE (chronická enteropatie)	X									X			X				(X)				COD-HY, COW-HY, CID-LF, CIW-LF	
	GI - IBD, kolitida, CE low fat (chronická enteropatie s nízkými tuky)	X									X		X	X				(X)				CID-LF, CIW-LF	
	GI - PLE (eneteropatie se ztrátou proteinů)	X									X		X	X				(X)				CID-LF, CIW-LF	
	GI - Lymfangiektázie	X									X		X	X				(X)				CID-LF, CIW-LF	
	Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM (suš.)	X			X						X	X		X								COW-HY	
	Pankreatitida vyžad. tuk pod 10% DM (suš.)	X			X						X		X	X								CID-LF, CIW-LF	
	Pankreatitida s hyperlipidemií	X			X						X		X	X								CID-LF, CIW-LF	
	Hyperlipidemie	X									X		X									CID-LF, CIW-LF	
	Urolitiáza, kalcium-oxaláty	X	X					X			X					X						CDD	
	Urolitiáza, uráty	X	X								X					X						CDD	
	Urolitiáza, cystiny	X	X					X			X					X						CDD	
	Urolitiáza, oxid křemičitý	X						X			X					X						CDD	
	Urolitiáza, struvity	X									X				X							COW-HY, COD-HY + Poznámka	Léčit antibiotiky a dočasně okyselovač moči
	Osteoartritida	X									X											COD-HY, COW-HY	
	Osteoartritida, nadváha	X									X	X										CID-LF, CIW-LF	Tyto diety mají vyšší až vysokou hladinu energie a živin - pro obézní zvířata se musí hodně
		X									X	X										COD-HY, COW-HY	
	Obezita	X									X		X									CID-LF, CIW-LF	
	Diabetes mellitus (cukrovka)	X							X		X											COD-HY/COW-HY s inzulínem	
	Anorexie, kachexie	X									X			X								COD-HY, COW-HY	

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná
 ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - SELHÁNÍ LEDVIN



STAV / KONDICE	SOUBĚŽNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBONHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3 NMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
SELHÁNÍ LEDVIN	Atopie		X			X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	Selhání ledvin, růst (>14 týdnů)			X			X									X				X		CGD, CGW, CDD	
	Selhání jater, encefalopatie		X			X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	Selhání jater, riziko vniku urátů		X			X		X	X		(X)					X						CKD, CKW	
	Selhání jater, cholestáza		X			X			X		X		X									CID-LF, CIW-LF	Přidat přípravky vychytávající fosfor, pro snížení sodíku vhodné přidat rýži; Na (od 0,26 do 0,18)**
			X	X		X		X				X										CGD + P-binder	
	Srdeční selhání SPOLU se selháním ledvin		X			X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	GI - maldigestce / malabsorpce		X			X		X	X		(X)			X		X	X		X			CKD, CKW	
	GI - EPI (exokrinní pankreatická insuficience)		X			X		X	X		(X)			X		X	X		X			CKD, CKW	
	GI - IBD, kolitida, CE low fat (chronická enteropatie s nízkými tuky)	X	X			X		X	X		X		X	X		X			X			CID-LF, CIW-LF s "lapačem fosforu"	Off label lze použít Porus One
	GI - PLE (eneteropatie se ztrátou proteinů)	X	X			X		X	X		X		X	X		X			X			CID-LF, CIW-LF s "lapačem fosforu"	Off label lze použít Porus One
	GI - Lymfangiektázie	X	X			X		X	X		X		X	X		X			X			CID-LF, CIW-LF s "lapačem fosforu"	Off label lze použít Porus One
	Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM (suš.)		X		X	X		X	X		X	X	X			X						CGD s "lapačem fosforu", pokud je to potřeba	
	Pankreatitida vyžad. tuk pod 10% DM (suš.)		X		X	X		X	X		X		X			X						CGD s "lapačem fosforu", pokud je to potřeba	
	Pankreatitida s hyperlipidemií		X		X	X		X	X		X	X	X			X						CGD s "lapačem fosforu", pokud je to potřeba	
	Hyperlipidemie		X			X		X	X		X		X			X						CGD s "lapačem fosforu", pokud je to potřeba	
	Urolitiáza, kalcium-oxaláty		X			X		X	X		(X)					X						CKD, CKW	
	Urolitiáza, uráty		X			X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	Urolitiáza, cystiny		X			X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	Urolitiáza, oxid křemičitý					X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	Urolitiáza, struvity		X			X		X	X		X				X							CKD, CKW + Poznámka	Léčit antibiotiky a dočasně okyselovač moči
	Osteoartrida		X			X		X	X		X											CKD, CKW	
	Osteoartrida, nadváha					X	X	X	X		X											CGW + "lapač fosforu" nebo CKD/CKW	Krmivo i dieta mají moderovaný obsah energie a živin - u obézních zvířat je potřeba monitorovat a upravovat jejich denní příjem v gramech
	Obezita		X			X	X	X	X		X	X										CGD+ "lapač fosforu", CKD, CKW	Krmte velmi střídavě
	Diabetes mellitus (cukrovka)		X			X		X		X	(X)											CKD/CKW + inzulín	
	Anorexie, kachexie		X			X		X	X		X			X		X						CKD, CKW	Přípravky pro podporu chuti

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná

 vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medicína/adaptace

**Obecná dávka: pokud se ke 100 g CID-LF přidá 120 g vařeného rýže, sníží se obsah Na z 0,26 na 0,18 g/MJ. Na 100 g CIW-LF je potřeba přidat 100 g vařeného rýže, aby se dosáhlo úrovně Na 0,18 g/MJ. Nicméně je vždy vhodné konzultovat s veterinárním lékařem.

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - SELHÁNÍ JATER



*JATERNÍ SELHÁNÍ, CHOLESTÁZA **JÁTRA, ENCEFALOPATIE NEBO CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN

STAV / KONDICE	SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBOHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3 NIMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
Potravní alergie		X		X				X	X		(X)			X								CDD, CDW	
Potravní alergie*		X		X					X		(X)	X										CDD	
		X		X					X		(X)		X									CID-LF, CIW-LF	
Atopie			X	X				X	X		X											CGW, CKD, CKW	
Selhání ledvin			X	X		X					(X)					X						CKD, CKW, CGD, CGW	
Selhání ledvin, růst (>14 týdnů)				X			X									X				X		CGD, CGW, CDD	
Srdeční selhání SPOLU se selháním ledvin		X				X		X	X		X					X						CKD, CKW	
Srdeční selhání BEZ se selháním ledvin				X				X	X		X											CGW	
GI - maldigesce/malabsorpce /EPI		X	X					X	X		(X)			X								CDD, CGD, CGW	
GI - maldigesce/malabsorpce**		X	X			(X)		X	X		(X)			X		(X)						CKD, CKW	
GI - IBD, kolitida, CE low fat (chronická enteropatie s nízkými tuky)	X	X	X					X	X		X		X	X					X			CID-LF, CIW-LF	Pokud je poměr protein/sodík příliš vysoký: přidejte rýži**
GI - PLE (eneteropatie se ztrátou proteinů)	X	X	X						X		X		X	X					X			CID-LF, CIW-LF	
GI - Lymfangiektázie	X	X	X						X		X		X	X					X			CID-LF, CIW-LF	
Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM (suš.)				X	X			X	X			X	X									CGD	
Pankreatitida vyžad. tuk pod 10% DM (suš.)				X	X			X	X				X									CGD , CID-LF, CIW-LF	Pokud je poměr protein/sodík v dietě CID/W-LF příliš vysoký: přidejte rýži**
Pankreatitida s hyperlipidemií				X	X			X	X				X									CGD , CID-LF, CIW-LF	
Hyperlipidemie		X	X					X	X		(X)		X									CGD , CID-LF, CIW-LF	
Urolitiáza, kalcium-oxaláty		X	X					X	X		(X)					X						CKD, CKW	
Urolitiáza, uráty		X						X	X							X						CKD, CKW	
Urolitiáza, cystiny		X						X	X							X						CKD, CKW	
Urolitiáza, oxid křemičitý		X	X					X	X							X						CKD, CKW	
Urolitiáza, struvity		X	X			X		X	X						X							CKD, CKW + Poznámka	Léčit antibiotiky a dočasně okyselovač moči
Osteoartritida		X	X					X	X		X											CKD, CKW nebo CGW (vyšší protein)	Pokud je požadován vyšší obsah bílkovin: promíchejte s CJD
Obezita		X	X					X	X			X										CGD	
Diabetes mellitus (cukrovka)		X	X					X	X	X	(X)											CKD/CKW/CGD/CGW s inzulinem	
Anorexie, kachexie		X	X					X	X		X			X								CKD, CKW, CGW	
Růst				X				X	X											X		CGD, CGW	Záleží na věku: přidejte Gistocal*

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná
 ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

*Gistocal je směs vitamínů a minerálů, která se hojně používá v západní Evropě (viz <https://www.beaphar.com/product/10317-gistocal/>), obsahuje 23 % vápníku a 11 % P a několik vitamínů. Hodně se používá k doplnění domácích diet.

**Obecná dávka: pokud se ke 100 g CID-LF přidá 120 g vařené rýže, sníží se obsah Na z 0,26 na 0,18 g/MJ. Na 100 g CIW-LF je potřeba přidat 100 g vařené rýže, aby se dosáhlo úrovně Na 0,18 g/MJ. Nicméně je vždy vhodné konzultovat s veterinárním lékařem.

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - SELHÁNÍ SRDCE BEZ SOUBĚŽNÉHO SELHÁNÍ LEDVIN



STAV / KONDICE	SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBONHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3-NMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
SELHÁNÍ SRDCE BEZ SOUBĚŽNÉHO SELHÁNÍ LEDVIN	Potravní alergie	x						x	x		x											COD-HY	PARNUT Na<0.18 g/MJ; COD-HY 0.18 g/MJ
	Atopie							x	x		x											COD, CGW	
	Kombinované alergie	x						x	x		x											COD-HY	
	Selhání jater, encefalopatie		x					x	x		x											CKD, CKW	
	Jaterní selhání obecně		x	x				x	x		x											CGW	
	GI - maldigestce/malabsorpce/EPI							x	x		x			x					(x)			COD, CGW, (COD-HY)	
	GI - IBD, kolitida, CE (chronická enteropatie)	x						x	x		x			x					(x)			COD-HY, (COD není hypoalergenní)	COD není hypoalergenní dieta, ale má vysoký obsah 3-NMK a může být účinná u kolitidy
	GI - PLE (eneteropatie se ztrátou proteinů)	x	x					x	x				x	x					x			CID-LF, CIW-LF	Pokud je sodík příliš vysoký: přidejte rýži**
	GI - Lymfangiektázie	x	x					x	x				x	x					x			CID-LF, CIW-LF	Pokud je sodík příliš vysoký: přidejte rýži**
	Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM			x	x			x	x		x	x	x									CGD	
	Pankreatitida vyžadující tuk pod 10% DM			x	x			x	x		x		x									CGD	
	Pankreatitida s hyperlipidemií			x	x			x	x		x		x									CGD	
	Hyperlipidemie		x					x	x		x		x									CGD	
	Urolitiáza, kalcium-oxaláty		x	x				x	x		x					x						CKD, CKW	
	Urolitiáza, uráty		x					x	x		x					x						CKD, CKW	
	Urolitiáza, cystiny		x					x	x		x					x						CKD, CKW	
	Urolitiáza, oxid křemičitý							x	x		x					x						CKD, CKW	
	Urolitiáza, struvity					x		x	x		x				x							COD, CGW	Léčit antibiotiky a dočasně okyselovač moči
	Osteoartritida							x	x		x											COD	
	Obezita							x	x		x	x	x									CGD, CED-DM	
	Diabetes mellitus (cukrovka)							x	x	x	x											CED-DM	
	Anorexie, kachexie							x	x		x			x								COD	
	Růst							x	x		x									x		COD-HY, CAD	Když se blíží konec růstu: přejít na COD

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná
 ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

**Obecná dávka: pokud se ke 100 g CID-LF přidá 120 g vařeného rýže, sníží se obsah Na z 0,26 na 0,18 g/MJ. Na 100 g CIW-LF je potřeba přidat 100 g vařeného rýže, aby se dosáhlo úrovně Na 0,18 g/MJ. Nicméně je vždy vhodné konzultovat s veterinárním lékařem.

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - SELHÁNÍ SRDCE SPOLU SE SOUBĚŽNÝM SELHÁNÍM LEDVIN



STAV / KONDICE	SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBONHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3 NMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
SELHÁNÍ SRDCE SPOLU SE SOUBĚŽNÝM SELHÁNÍM LEDVIN	Atopie		x			x		x	x		x					x						CKD, CKW	
	Selhání ledvin, růst			x			x				x					x				x		CGW	
	Selhání jater, encefalopatie		x			x		x	x		x					x						CKD, CKW	
	Selhání jater, riziko vniku urátů		x			x					x					x						CKD, CKW	
	Selhání jater, cholestáza		x			x			x		x		x									CID-LF, CIW-LF	S přípravkem, který vychytává fosfor popř. přidat rýži pro snížení sodíku (z 0,26 na 0,18)**
			x	x		x		x				x										CGD + P-binder	
	GI - maldigesce/malabsorpce		x			x		x	x		x			x			x					CKD, CKW	
	GI - EPI (exokrinní pankreatická insuficience)		x			x		x	x		x			x			x					CKD, CKW	
	GI - IBD, kolitida, CE s nízkým obsahem tuku																						
	GI - PLE (eneteropatie se ztrátou proteinů)	x	x			x		x	x		x		x	x					x			CID-LF, CIW-LF s "lapačem fosforu"	Off label lze přidat Porus One, při GI - PLE přidejte rýži pro snížení sodíku
	GI - Lymfangiektázie																						
	Pankreatitida, tolerance tuku do 10-15% DM (sušiny)		x		x	x		x	x		x	x	x			x						CGD + "lapač fosforu"	
	Pankreatitida, tolerance tuku < 10% DM (sušiny)		x		x	x		x	x		x		x									CGD + "lapač fosforu"	
	Pankreatitida s hyperlipidemií		x		x	x		x	x		x		x									CGD + "lapač fosforu"	
	Hyperlipidemie		x			x		x	x		x		x									CGD + "lapač fosforu"	
	Urolitiáza, kalcium-oxaláty		x			x		x	x		x					x						CKD, CKW	
	Urolitiáza, uráty		x			x		x	x		x					x						CKD, CKW	
	Urolitiáza, cystiny		x			x		x	x		x					x						CKD, CKW	
	Urolitiáza, oxid křemičitý		x			x		x	x		x					x						CKD, CKW	
	Urolitiáza, struvity		x			x		x	x		x				x							CKD, CKW + Poznámka	Léčit antibiotiky a dočasně okyselořit moči
	Osteoartritida		x			x		x	x		x											CKD, CKW	
	Obezita		x			x	x	x	x		x	x										CGD + "lapač fosforu"	
	Diabetes mellitus (cukrovka)		x			x		x	x	x	(x)											CKD/CKW + inzulín	
	Anorexie, kachexie		x			x		x	x		x			x								CKD, CKW	Přípravky pro podporu chuti
	Růst			x			x	x	x		x									x		CGW, (CGD)	

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná

■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medicína/adaptace

**Obecná dávka: pokud se ke 100 g CID-LF přidá 120 g vařené rýže, sníží se obsah Na z 0,26 na 0,18 g/MJ. Na 100 g CIW-LF je potřeba přidat 100 g vařené rýže, aby se dosáhlo úrovně Na 0,18 g/MJ. Nicméně je vždy vhodné konzultovat s veterinárním lékařem.

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - KLOUBY



STAV / KONDICE	SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBOHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3 NMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
KLOUBY	Potravní alergie	x									x											COD-HY, COW-HY	
	Selhání ledvin		x			x		x			x											CKD, CKW	
	Selhání jater		x	x				x	x		x											CKD, CKW, CGW	
	Srdce bez selhání ledvin							x	x		x											COD	
	Srdce + selhání ledvin		x			x		x			x											CKD, CKW	
	GI - maldigestce/malabsorpce/EPI										x			x					(x)			COD-HY, COW-HY	
	GI - IBD, kolitida, CE (chronická enteropatie)	x									x			x					(x)			COD-HY, COW-HY	
	GI - IBD, kolitida, CE s nízkým obsahem tuku	x									x	x	x						(x)			CID-LF, CIW-LF	
	GI - PLE (eneteropatie se ztrátou proteinů)	x									x	x	x						(x)			CID-LF, CIW-LF	
	GI - Lymfangiektázie	x									x	x	x						(x)			CID-LF, CIW-LF	
	Pankreatitida, tolerance tuku do 10-15% DM (sušiny)			x	x						x	x										COW-HY, CID-LF, CIW-LF	
	Pankreatitida, tolerance tuku < 10% DM (sušiny)			x	x						x		x									CID-LF, CIW-LF	
	Pankreatitida s hyperlipidemií			x	x						x	x										CID-LF, CIW-LF	
	Hyperlipidemie										x	x										CID-LF, CIW-LF	
	Obezita / WR (redukce hmotnosti)										x	x										CJD (<15% nadváha), CRD (> 15% nadváha), CID-LF/CIW-LF	
	Urolitiáza, struvity						x				x				x							CJD s antibiotiky a okyselovači	
	Urolitiáza, kalcium-oxaláty		x					x	x		x					x						CKD, CKW	
	Urolitiáza, uráty		x					x	x		x					x						CKD, CKW	
	Urolitiáza, cystiny		x								x					x						CKD, CKW	
	Diabetes mellitus (cukrovka)									x	x											CED-DM	

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - CUKROVKA



POZNÁMKA:
PSI MAJÍ IDDM
(INZULIN
DEPENDENTNÍ
DIABETES
MELLITUS),
TAKŽE JE
NUTNÁ LÉČBA
INZULÍNEM

STAV / KONDICE	SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBONHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3-NMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
CUKROVKA	Potravní alergie	X								X	X											COD-HY/COW-HY + Inzulín	
	Atopie									X	X											CED-DM, F/C-IN-W	
	Potravní alergie a atopie	X								X	X											COD-HY/COW-HY + Inzulín	
	Ledviny		X			X		X		X	(X)											CKD/CKW + inzulín	
	Játra obecně		X	X				X	X	X	(X)											CKD/CKW,/CGD/CGW s inzulínem	CGD nemá vysoké hladiny 3-NMK
	Játra encefalopatie		X	X				X	X	X	(X)											CKD/CKW,/CGD/CGW s inzulínem	CGD nemá vysoké hladiny 4-NMK
	Játra cholestáza			X	X								X	X				X				CRD-1, CRD-2	Nemá střední hladinu proteinů!
	Srdce bez selhání ledvin							X	X	X	X							X				CED-DM	
	Srdce + selhání ledvin		X			X		X		X	X											CKD/CKW + inzulín	Nebo CKD/CKW + Inzulín
	GI - maldigesce/malabsorpce/EPI									X				X								F/C-IN-W/L, C-BIO-W	
	GI - IBD, kolitida, CE (chron. enteropat.)	X								X	X			X								COD-HY, COW-HY + inzulín	
	GI - IBD, kolitida, CE s nízkým obsahem tuku	X								X			X	X								CID-LF, CIW-LF + inzulín	
	GI - PLE (eneteropatie se ztrátou proteinů)	X								X			X	X								CID-LF, CIW-LF + inzulín	
	GI - Lymfangiektázie	X								X			X	X								CID-LF, CIW-LF + inzulín	
	Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM									X		X		X				X				CED-DM, CRD-2	CED-DM: nízký obsah sacharidů: CRD-2 vysoký obsah vlákniny
	Pankreatitida vyžadující tuk pod 10% DM									X			X					X				CRD-2	NE s nízkým obsahem sacharidů, ale s vysokým obsahem vlákniny
	Pankreatitida s hyperlipidemií									X		X	X					X				CED-DM, CRD-2	CED-DM: nízký obsah sacharidů: CRD-2 vysoký obsah vlákniny
	Hyperlipidemie									X		X	X					X				CED-DM, CRD-2	
	Urolitiáza, kalcium-oxaláty		X					X		X	X					X						CKD, CKW + inzulín	
	Urolitiáza, uráty		X							X	X					X						CKD, CKW + inzulín	
	Urolitiáza, cystiny		X					X		X	X					X						CKD, CKW + inzulín	
	Urolitiáza, oxid křemičitý							X		X	X					X						CKD, CKW + inzulín	
	Urolitiáza, struvity									X	X				X			X				CED-DM, CRD-1/-2	Léčit antibiotiky a dočasně okyselovač moči
	Idiopatická cystitida									X	X											CED-DM	
	Osteoartritida										X		X					X				CRD-1, CRW-1, CRD-2	
	Obezita									X	X											F/C-IN-W/L	
	Anorexie, recovery, kachexie																						

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - RŮST



STAV / KONDICE	SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ NÍZKÉ KARBONHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3 NIMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
RŮST	Potravní alergie	X																		X		CDD-HY, COD-HY, COW-HY	
	Atopie										X									X		COD-HY, COW-HY	
	Kombinovaná alergie (atopie & potravní alergie)	X									X									X		COD-HY, COW-HY	
	Selhání ledvin			X			X				(X)					X				X		CGD, CGW	Štěňata starší 14 týdnů
	Selhání jater, shunt/encefalopatie			X				X												X		CDD mixed with CPD	Záleží na věku
	Selhání jater, riziko vniku urátů			X												X				X		CDD	Závisí na věku, pokud je potřeba, přidejte Gistocal (vápník / fosfor) nebo i vejce
	Jaterní selhání, cholestáza			X								X	X							X		CGD (Ne CGW)	V závislosti na věku další Gistocal*
	Srdeční selhání SPOLU se selháním ledvin			X			X		X		X									X		CGW	V závislosti na věku přidat vápník / fosfor (ne sodík)
	Srdeční selhání BEZ se selhání ledvin							X			X									X		CAD	
	GI - maldigesce/malabsorpce													X			X		(X)	X		CID, CIW, COD-HY, COW-HY, CDD-HY	
	GI - EPI													X			X		(X)	X			+ trávicí enzymy
	GI - IBD, kolitida, CE (chron. enteropat.)	X									X			X					(X)	X		COD-HY, COW-HY	
	GI - IBD, kolitida, CE s nízkým obsahem tuku	X									X		X	X					(X)	X		CID-LF, CIW-LF	Pro mladá štěňata nějaký extra Gistocal (vápník / fosfor)
	GI - PLE (eneteropatie se ztrátou proteinů)	X									X		X	X					(X)	X		CID-LF, CIW-LF	
	GI - Lymfangiektázie										X		X	X					(X)	X		CID-LF, CIW-LF	
	Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM				X						X	X		X						X		CID, CIW, CPD-XL, CDD-HY, COW-HY	
	Pankreatitida vyžadující tuk pod 10% DM				X						X		X	X						X		CID-LF, CIW-LF	Pro mladá štěňata nějaký extra Gistocal (vápník / fosfor)
	Pankreatitida s hyperlipidemií				X						X	X	X	X						X		COW-HY, CID-LF, CIW-LF	Pro mladá štěňata nějaký extra Gistocal (vápník / fosfor) při krmení CID-LF anebo CIW-LF
	Hyperlipidemie										X		X							X		COW-HY, CID-LF, CIW-LF	Pro mladá štěňata nějaký extra Gistocal (vápník / fosfor)
											X		X							X		CRD-1, CRD-2	

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná

■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medicína/adaptace

*Gistocal je směs vitaminů a minerálů, která se hojně používá v západní Evropě (viz <https://www.beaphar.com/product/10317-gistocal/>), obsahuje 23 % vápníku a 11 % P a několik vitaminů. Hodně se používá k doplnění domácích diet.

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - RŮST (POKRAČOVÁNÍ)



STAV / KONDICE	SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3 NMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMENTOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
RŮST	Urolitiáza, kalcium-oxaláty			x				x								x				x		CGW, CGD - zkontrolujte pH + Gistocal	V případě potřeby přidejte citrát draselný, v dospělosti přejděte na CKW/CKD
	Urolitiáza, uráty			x												x				x		CDD s Gistocalem. Zkontrolujte pH	V případě potřeby přidejte citrát draselný, v dospělosti pouze CDD
	Urolitiáza, cystiny			x				x								x				x		CGW, CGD - zkontrolujte pH + Gistocal	V případě potřeby přidejte citrát draselný, v dospělosti přejděte na CKW/CKD
	Urolitiáza, oxid křemičitý							x								x				x		CDD s Gistocalem. Zkontrolujte pH	
	Struvitová urolitiáza, mladá štěňata < 6 měsíců														x					x		FCD-L	Antibiotika. U mladých štěňat přidejte vápník / fosfor (Gistocal*). Pouze krátkodobě.
	Struvitová urolitiáza, štěňata nad 6 měsíců, více jak k 50% struvitů														x					x		CCD	Antibiotika – CCD pouze krátkodobě. Monitorujte recidivující UTI
	Osteoartritida										x									x		COD-HY nebo CJD s vápník / fosfor	
	Obezita										x		x							x		CRD-1, CRW	
	Diabetes mellitus (cukrovka)									x	x									x		CED-DM, F/C-IN-W, CRD-1/CRW	Mladá štěňata: extra fosfor (Gistocal) do CED-DM
											x							x		x		CRD-1. CRD-2	(Potřeba karbohydrátů s vysokým obsahem vlákniny)
	Anorexie, kachexie										x			x						x		CPW, F/C-IN-W/L, COD-HY, COW-HY	

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná

■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

*Gistocal je směs vitaminů a minerálů, která se hojně používá v západní Evropě (viz <https://www.beaphar.com/product/10317-gistocal/>), obsahuje 23 % vápníku a 11 % P a několik vitaminů. Hodně se používá k doplnění domácích diet.

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - SMÍŠENÉ UROLITY



STAV / KONDICE	SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBOHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3 NMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
SMÍŠENÉ UROLITY	Struvity, kalcium-oxaláty		X					X	X							X						CKD, CKW	Sledujte opakování UTI SG < 1,020 : použijte vlhké krmivo = konzervy nebo suché krmivo (granule) přelijte před podáním teplou vodou Zkontrolujte pH – pokud je příliš nízké: přidejte citrát draselný (počáteční dávka 2x denně 50-75 mg/kg)
	Struvity, uráty		X													X						CDD (nízký obsah purinů), CKD/CKW	
	Struvity / kalcium-fosfáty					X		X	X							X						CKD/CKW	
	Struvity / kalcium-oxaláty / kalcium-fosfáty		X			X		X	X							X						CKD/CKW	
	Kalcium-oxaláty / kalcium-fosfáty		X			X		X	X							X						CKD/CKW	
	Struvity / uráty / kalcium-fosfáty		X				X									X						CDD (nízký obsah purinů), CKD/CKW	
	Struvity / oxid křemičitý								X							X						CKD/CKW	

SNÍŽENÍ FREKVENCE RECIDIVY - Smíšené kameny nelze rozpustit; často počáteční kámen způsobí infekci močových cest (UTI), která způsobí precipitaci struvitů. Snížení recidivy je zaměřeno na počáteční kámen.

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace