

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - SELHÁNÍ JATER



*JATERNÍ SELHÁNÍ, CHOLESTÁZA **JÁTRA, ENCEFALOPATIE NEBO CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN

STAV / KONDICE	SOUČASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	NÍZKÉ KARBONHYDRÁTY	VYSOKÉ HLADINY 3 NMIK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČÍ	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČÍ	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
Potravní alergie		X		X				X	X		(X)			X								CDD, CDW	
Potravní alergie*		X		X					X		(X)	X										CDD	
		X		X					X		(X)		X									CID-LF, CIW-LF	
Atopie			X	X				X	X		X											CGW, CKD, CKW	
Selhání ledvin			X	X		X					(X)					X						CKD, CKW, CGD, CGW	
Selhání ledvin, růst (>14 týdnů)				X			X									X				X		CGD, CGW, CDD	
Srdeční selhání SPOLU se selháním ledvin		X				X		X	X		X					X						CKD, CKW	
Srdeční selhání BEZ se selháním ledvin				X				X	X		X											CGW	
GI - maldigesce/malabsorpce /EPI			X	X				X	X		(X)			X								CDD, CGD, CGW	
GI - maldigesce/malabsorpce**			X	X		(X)		X	X		(X)			X		(X)						CKD, CKW	
GI - IBD, kolitida, CE low fat (chronická enteropatie s nízkými tuky)		X	X	X				X	X		X		X	X					X			CID-LF, CIW-LF	Pokud je poměr protein/sodík příliš vysoký: přidejte rýži**
GI - PLE (eneteropatie se ztrátou proteinů)		X	X	X					X		X		X	X					X			CID-LF, CIW-LF	
GI - Lymfangiektázie		X	X	X					X		X		X	X					X			CID-LF, CIW-LF	
Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM (suš.)				X	X			X	X			X	X									CGD	
Pankreatitida vyžad. tuk pod 10% DM (suš.)				X	X			X	X				X									CGD , CID-LF, CIW-LF	Pokud je poměr protein/sodík v dietě CID/W-LF příliš vysoký: přidejte rýži**
Pankreatitida s hyperlipidemií				X	X			X	X				X									CGD , CID-LF, CIW-LF	
Hyperlipidemie			X	X				X	X		(X)		X									CGD , CID-LF, CIW-LF	
Urolitiáza, kalcium-oxaláty			X	X				X	X		(X)					X						CKD, CKW	
Urolitiáza, uráty			X					X	X							X						CKD, CKW	
Urolitiáza, cystiny			X					X	X							X						CKD, CKW	
Urolitiáza, oxid křemičitý			X	X				X	X							X						CKD, CKW	
Urolitiáza, struvity			X	X		X		X	X						X							CKD, CKW + Poznámka	Léčit antibiotiky a dočasně okyselovač moči
Osteoartritida			X	X				X	X		X											CKD, CKW nebo CGW (vyšší protein)	Pokud je požadován vyšší obsah bílkovin: promíchejte s CJD
Obezita			X	X				X	X			X										CGD	
Diabetes mellitus (cukrovka)			X	X				X	X	X	(X)											CKD/CKW,/CGD/CGW s inzulinem	
Anorexie, kachexie			X	X				X	X		X			X								CKD, CKW, CGW	
Růst				X				X	X											X		CGD, CGW	Záleží na věku: přidejte Gistocal*

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu ■ vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my ■ vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná
 ■ vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medikace/adaptace

*Gistocal je směs vitamínů a minerálů, která se hojně používá v západní Evropě (viz <https://www.beaphar.com/product/10317-gistocal/>), obsahuje 23 % vápníku a 11 % P a několik vitamínů. Hodně se používá k doplnění domácích diet.

**Obecná dávka: pokud se ke 100 g CID-LF přidá 120 g vařeného rýže, sníží se obsah Na z 0,26 na 0,18 g/MJ. Na 100 g CIW-LF je potřeba přidat 100 g vařeného rýže, aby se dosáhlo úrovně Na 0,18 g/MJ. Nicméně je vždy vhodné konzultovat s veterinárním lékařem.