

SPECIFIC™ DIETY PRO PSY SE SOUBĚŽNÝMI PROBLÉMY - SELHÁNÍ LEDVIN



STAV / KONDICE	SOUCASNÝ STAV / VLASTNOSTI	HYPO-ALERGENNÍ	NÍZKÝ PROTEIN	MÍRNĚ SNÍŽENÝ PROTEIN	STŘEDNÍ PROTEIN	NÍZKÝ FOSFOR	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ FOSFOR	NÍZKÝ SODÍK	STŘEDNĚ SNÍŽENÝ SODÍK	KARBOHYDRÁTY NÍZKÉ	VYSOKÉ HLADINY 3 NMK	NÍZKÝ TUK (10-15% DM)	VELMI NÍZKÝ TUK (POD 10% DM)	VYSOCE STRAVITELNÉ	NÍZKÉ pH MOČI	NEUTRÁLNÍ - VYSOKÉ pH MOČI	NÍZKÁ VLÁKNINA	VYSOKÁ VLÁKNINA	PODPORA GI / FERMEN-TOVATELNÁ VLÁKNINA / AURAGUARD™	PODPORA RŮSTU	JINÉ	DOPORUČENÁ DIETA	POZNÁMKA
SELHÁNÍ LEDVIN	Atopie		X			X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	Selhání ledvin, růst (>14 týdnů)			X			X									X				X		CGD, CGW, CDD	
	Selhání jater, encefalopatie		X			X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	Selhání jater, riziko vniku urátů		X			X		X	X		(X)					X						CKD, CKW	
	Selhání jater, cholestáza		X			X			X		X		X									CID-LF, CIW-LF	Přidat přípravky vychytávající fosfor, pro snížení sodíku vhodné přidat rýži; Na (od 0,26 do 0,18)**
			X	X		X		X				X										CGD + P-binder	
	Srdeční selhání SPOLU se selháním ledvin		X			X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	GI - maldigestce / malabsorpce		X			X		X	X		(X)			X		X	X		X			CKD, CKW	
	GI - EPI (exokrinní pankreatická insuficience)		X			X		X	X		(X)			X		X	X		X			CKD, CKW	
	GI - IBD, kolitida, CE low fat (chronická enteropatie s nízkými tuky)	X	X			X		X	X		X		X	X		X			X			CID-LF, CIW-LF s "lapačem fosforu"	Off label lze použít Porus One
	GI - PLE (eneteropatie se ztrátou proteinů)	X	X			X		X	X		X		X	X		X			X			CID-LF, CIW-LF s "lapačem fosforu"	Off label lze použít Porus One
	GI - Lymfangiektázie	X	X			X		X	X		X		X	X		X			X			CID-LF, CIW-LF s "lapačem fosforu"	Off label lze použít Porus One
	Pankreatitida, toler. tuku do 10-15% DM (suš.)		X		X	X		X	X		X	X	X			X						CGD s "lapačem fosforu", pokud je to potřeba	
	Pankreatitida vyžad. tuk pod 10% DM (suš.)		X		X	X		X	X		X		X			X						CGD s "lapačem fosforu", pokud je to potřeba	
	Pankreatitida s hyperlipidemií		X		X	X		X	X		X	X	X			X						CGD s "lapačem fosforu", pokud je to potřeba	
	Hyperlipidemie		X			X		X	X		X		X			X						CGD s "lapačem fosforu", pokud je to potřeba	
	Urolitiáza, kalcium-oxaláty		X			X		X	X		(X)					X						CKD, CKW	
	Urolitiáza, uráty		X			X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	Urolitiáza, cystiny		X			X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	Urolitiáza, oxid křemičitý					X		X	X		X					X						CKD, CKW	
	Urolitiáza, struvity		X			X		X	X		X				X							CKD, CKW + Poznámka	Léčit antibiotiky a dočasně okyselovač moči
	Osteoartrida		X			X		X	X		X											CKD, CKW	
	Osteoartrida, nadváha					X	X	X	X		X											CGW + "lapač fosforu" nebo CKD/CKW	Krmivo i dieta mají moderovaný obsah energie a živin - u obézních zvířat je potřeba monitorovat a upravovat jejich denní příjem v gramech
	Obezita		X			X	X	X	X		X	X										CGD+ "lapač fosforu", CKD, CKW	Krmte velmi střídavě
	Diabetes mellitus (cukrovka)		X			X		X		X	(X)											CKD/CKW + inzulin	
	Anorexie, kachexie		X			X		X	X		X			X		X						CKD, CKW	Přípravky pro podporu chuti

x vhodné pro optimální nutriční podporu (x) dobré pro optimální nutriční podporu vlastnost, kterou dieta řeší daný problém/my vlastnost, kterou dieta zcela nevyřeší daný problém/my, ale je pro něj/ně přijatelná

 vlastnost, kterou dieta nesplňuje nebo splňuje jen částečně, ale je asi nejvhodnější možností; někdy je nutná medicína/adaptace

**Obecná dávka: pokud se ke 100 g CID-LF přidá 120 g vařeného rýže, sníží se obsah Na z 0,26 na 0,18 g/MJ. Na 100 g CIW-LF je potřeba přidat 100 g vařeného rýže, aby se dosáhlo úrovně Na 0,18 g/MJ. Nicméně je vždy vhodné konzultovat s veterinárním lékařem.