



	CCD Struvit Management	CKD & CKW Heart & Kidney Support	CKD-HY & CKW-HY	CDD Food Allergen Management	CT-SC Special Care Treats	CGD-S, M, XL a CGW Senior
						
	• Diéta má znížený obsah horčíku a fosforu na rozpúšťanie a redukciu vzniku struvitových kryštálov a kameňov. • Kyslé pH moču pod 6,4 rozpúšťa struvitové kryštály a minimalizuje možnosť vzniku nových struvitových kryštálov. • Zvýšený obsah sodíka podporuje u psa vyšší príjem tekutín.	• Znížený obsah bielkovín v diéte znižuje výskyt oxalátov, cystínov a urátov v moči. • Alkalické pH moču zabraňuje precipitácii kalcium oxalátových, urátových a cystínových kryštálov a to napomáha udržiavať zdravý močový trakt. • Pridaný citrát draselný napomáha udržať kalcium oxalát v roztoku.	• Znížený obsah bielkovín v diéte znižuje výskyt oxalátov, cystínov a urátov v moči. • Alkalické pH moču zabraňuje precipitácii kalcium oxalátových, urátových a cystínových kryštálov a to napomáha udržiavať zdravý močový trakt. • Pridaný citrát draselný napomáha udržať kalcium oxalát v roztoku. • Obličkové zlyhanie súbežne s intoleranciou na niektoré zložky alebo živiny	Prvá voľba pri redukcii urátových kameňov a to vďaka: • Veľmi nízkemu obsahu purínu. • Nízkemu obsahu bielkovín. • Alkalickému pH moču.	• Receptúry sú zostavené tak, aby vyhovovali aj psom, ktoré prijímajú diéty na podporu liečby pri urolitiáze. • Nízky obsah bielkovín, energie, tukov a vybraných minerálov vrátane fosforu, sodíka a vápnika.	• Znížený obsah bielkovín, fosforu a sodíka výrazne znižuje zaťaženie obličiek a podporuje u starších psov ich funkciu.
STRUVITY – ROZPÚŠŤANIE	✓				✓	
STRUVITY – REDUKCIA NÁVRATU	✓				✓	
OXALÁT – REDUKCIA NÁVRATU		✓	✓		✓	
URÁT – ROZPÚŠŤANIE				✓	✓	
URÁT – REDUKCIA NÁVRATU		✓	✓		✓	
CYSTÍN – ROZPÚŠŤANIE		✓	✓			
CYSTÍN – REDUKCIA NÁVRATU		✓	✓		✓	
OBLIČKOVÉ ZLYHANIE / NEDOSTATOČNOSŤ STABILIZOVANÉ FORMY		✓	✓		✓	✓
URÉMIA		✓	✓		✓	
SÚBEŽNE S INTOLERANCIOU NA NIEKOTRÉ ZLOŽKY A ŽIVINY			✓			





	FCD, FCW & FCW-P Crystal Management	FSW Struvite Dissolution	FCD-L & FRD Weight Reduction	FKD, FKW & FKW-P Kidney Support	FKD-HY & FKW-HY	FT-H Healthy Treats	FGD & FGW FXW & FXW-P	FND & FXD
								
	- Nízke hodnoty RSS moču pre struvity a kalcium oxaláty zaistia tzv. podsýtenie a nízku metastabilnú saturáciu, respektíve minimalizujú riziko tvorenia nových struvitových a kalcium oxalátových kryštálov v moči. - Znížený obsah horčíku a fosforu – redukcia návratu struvitových kryštálov a kameňov. - Kyslé pH moču pod 6,4 rozpúšťa existujúce struvitové kryštály a minimalizuje vznik nových struvitových kryštálov.	- Znížený obsah horčíku a fosforu – redukcia návratu struvitových kryštálov a kameňov. - Kyslé pH moču 6,0–6,3 rozpúšťa existujúce struvitové kryštály a minimalizuje vznik nových struvitových kryštálov. - Zvýšený obsah sodíku – vyšší príjem tekutín = znížená koncentrácia minerálnych látok v moči a zvýšená frekvencia močenia.	- Nízke hodnoty RSS moču pre struvity a kalcium oxaláty zaistia tzv. podsýtenie a nízku metastabilnú saturáciu, respektíve minimalizujú riziko tvorenia nových struvitových a kalcium oxalátových kryštálov v moči. - Znížený obsah horčíku a fosforu – redukcia návratu struvitových kryštálov a kameňov. - Kyslé pH moču pod 6,4 rozpúšťa existujúce struvitové kryštály a minimalizuje vznik nových struvitových kryštálov. - Znížená energetická hodnota pomáha udržiavať ideálnu hmotnosť.	- Znížený obsah bielkovín znižuje výskyt oxalátov, cystínov a urátov v moči. - Alkalické pH moču zabraňuje precipitácií kalcium oxalátových, urátových a cystínových kryštálov a to napomáha k udržaniu zdravého močového traktu. - Pridaný citrát draselný napomáha udržať kalcium oxalát v roztoku.	- Znížený obsah bielkovín znižuje výskyt oxalátov, cystínov a urátov v moči. - Alkalické pH moču zabraňuje precipitácií kalcium oxalátových, urátových a cystínových kryštálov a to napomáha k udržaniu zdravého močového traktu. - Pridaný citrát draselný napomáha udržať kalcium oxalát v roztoku. - Obličkové zlyhanie súbežne s intoleranciou na niektoré zložky alebo živiny.	- Pre mačky, ktoré majú diétne opatrenie pri liečbe urolitiázy. - Nízky obsah bielkovín. - Nízke hladiny vápnika, fosforu, horčíka a sodíka.	- Pôsobí preventívne proti vzniku kalcium oxalátových kryštálov a podporuje zdravý močový trakt. - Mierne znížená hladina bielkovín a sodíka. - Zvýšená hladina citrátu draselného, pH okolo 6,6. - Nízke hodnoty RSS pre struvity a kalcium oxaláty. - Zvýšený obsah vitamínov skupiny B a draslíka postačuje pre dopĺňovanie týchto živín, ktoré sa strácajú obličkami pri používaní diuretík.	- Zabraňujú rozvoji struvitovej urolitiázy a podporujú zdravý močový trakt. - Nízky obsah horčíku a fosforu. - Hladiny pH 6,0 a 6,3. - Nízke hodnoty RSS pre struvity a kalcium oxaláty.
STRUIVITY – ROZPÚŠŤANIE	✓	✓	✓			✓		
STRUIVITY – REDUKCIA NÁVRATU	✓		✓ AJ OBÉZNE			✓	✓	✓
OXALÁT – REDUKCIA NÁVRATU				✓	✓	✓	✓	✓
URÁT – ROZPÚŠŤANIE				✓	✓	✓		
URÁT – REDUKCIA NÁVRATU				✓	✓	✓		
CYSTÍN – ROZPÚŠŤANIE				✓	✓			
CYSTÍN – REDUKCIA NÁVRATU				✓	✓	✓		
OBLIČKOVÉ ZLYHANIE / NEDOSTATOČNOSŤ STABILIZOVANÉ FORMY				✓	✓		✓	
URÉMIA				✓	✓			
IDIOPATICKÁ CYSTITÍDA					✓		✓ iba FXW a FXW-P	
SÚBEŽNE S INTOLERANCIOU NA NIEKOTRÉ ZLOŽKY A ŽIVINY					✓			

